

Impfkalender 2019/2020 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2019



impfen-info.de

Wissen, was schützt.



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)					Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)										
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)		
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)		
Keuchhusten (Pertussis)		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N	A ^d		
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1	G2	G3	G4	N							
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1	G2	G3	G4	N		A		N	ggf. N		
Hepatitis B						N							
Pneumokokken		G1 ^b		G2	G3	N						S ^f	
Meningokokken C					G (ab 12 Monaten)		N						
Masern					G1	G2	N				S ^e		
Mumps					G1	G2	N						
Röteln					G1	G2	N						
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N						
HPV (Humane Papillomviren)								G1+G2 ^c	N ^c				
Gürtelrose (Herpes zoster)												G1+G2 ^h	
Grippe (Influenza)							Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere					S (jährlich)	

U Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

J Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

S Standardimpfung

A Auffrischimpfung

a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

c 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

h Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.